

Golongan yang cuba menyelamatkan tapir



'Tapir Specialist Group' (TSG) adalah sebuah organisasi saintifik yang tubuhkan pada 1980 sebagai sebahagian daripada 120 'Specialist Groups' di dalam 'International Union for the Conservation of Nature' (IUCN) 'Species Survival Commission' (SSC).

Tujuan utama penubuhan TSG adalah bagi memulihara kepelbagaian biologi dengan merangsang, membangunkan dan melaksanakan program praktikal bagi mendalami, menyelamatkan, membaik pulih dan menguruskan kesemua empat spesis tapir dan habitat asalnya di Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Ahli IUCN/SSC 'Tapir Specialist Group' terlibat secara langsung di dalam pelbagai projek dalam usaha memahami spesis ini tapir dan memulihara populasi yang masih ada. Ahli TSG telah menjalankan penyelidikan saintifik (di habitat asal dan di dalam kurungan), mengadakan program pendidikan dan kesedaran umum bersama masyarakat setempat yang tinggal berhampiran dengan habitat spesis ini. Juga menyokong usaha bagi memulihara habitat tersebut.

Sehingga hari ini, TSG mempunyai hampir 100 orang ahli dari 25 negara di seluruh dunia – termasuklah penyelidik lapangan, pendidik, veterinar, agensi kerajaan, wakil badan bukan kerajaan, kakitangan zoo, pelajar dan pensyarah universiti. Golongan ini berkait rapat secara langsung atau tidak di dalam penyelidikan lapangan dan/atau pembiakan dalam kurungan di negara masing-masing. Lebih 50 peratus ahli organisasi kami berasal dari negara asal taburan mamalia ini.

Anda boleh membantu TSG dengan melawat laman web 'Tapir Specialist Group' dan belajar sebanyak mungkin tentang tapir. Berkongsilah apa yang telah anda pelajari bersama keluarga dan sahabat dan berikan sumbangan kepada organisasi kami sebagai langkah pertama untuk menyokong usaha konservasi ini.

www.tapirspecialistgroup.org

Tapir di dunia



Tapir Pergunungan

Tapirus pinchaque



Tapir Tanah Rendah

Tapirus terrestris



Tapir Baird

Tapirus bairdii



Tapir Malaya

Tapirus indicus



Mengenai tapir

Apa itu tapir?

Tapir adalah mamalia yang sering kali disalah tanggap sebagai babi, 'capybara' dan 'giant anteater'. Ungulat berkuku-digit-ganjil yang turut berada dalam keluarga yang sama dengan tapir adalah kuda dan badak.

Terdapat empat spesies tapir – Tapir Baird, Tapir Tanah Rendah, Tapir Pergunungan dan Tapir Malaya.

Salah satu karakter tapir yang paling mudah dikenali adalah struktur muncungnya yang digunakan untuk meragut dedaun. Tapir juga bergantung kepada buah-buahan di dalam dietnya. Biji dari buah-buahan ini akan disebarkan di dalam najis dan ia membantu kestabilan ekosistem hutan.

Anak tapir dilahirkan dengan corak tubuh yang aneh. Terdapat jalur memanjang di sepanjang tubuh dan dilengkapi bintik-bintik putih, struktur ini penting bagi penyamaran. Setelah dewasa, corak ini akan hilang.

Tapir menghadapi masalah!

Menurut IUCN Red List, kedua-dua Tapir Baird dan Tapir Pergunungan adalah terancam. Ini bermakna bilangan individu yang masih di habitat asal adalah sangat rendah dan spesies ini mungkin akan pupus di masa hadapan.

Tapir Tanah Rendah dan Tapir Malaya dikelaskan sebagai Lemah, ini bermakna hanya sekumpulan kecil tapir dewasa yang tinggal di habitat asal dan bilangan ini tidak cukup kuat untuk mengembangkan populasi agar mencapai tahap yang sihat.

Pemusnahan habitat semula jadi dan pemburuan adalah ancaman terbesar mamalia ini.

Tapir Malaya

Tapirus indicus

Dewasa



Anak

Spesies tapir terbesar dan satu-satunya yang ditemui di Asia. Ia mempunyai tubuh berwarna hitam dan putih. Ciri ini membezakan Tapir Malaya berbanding tapir lain dan ia membantunya menyamar. Buah-buahan gugur, tunas lembut, dedaun muda adalah diet utamanya.

Panjang: 6 - 8 ¼ kaki (1.8 - 2.5 m)

Berat: 220 - 1,102 paun (100 - 500 kg)

Status: Lemah

Taburan: Asia Tenggara

Tapir Pergunungan

Tapirus pinchaque

Dewasa



Anak



Tapir Pergunungan tinggal di kawasan beraltitud tinggi dan sejuk di Colombia, Ecuador dan Peru. Ia mempunyai kulit tubuh yang tebal dan dilengkapi struktur bulu bagi memanasakan tubuh. Bibir dan telinganya berwarna putih. Spesies ini meragut dedaun dan buah-buahan dari pelbagai jenis pokok kerdil dan belukar di waktu awal pagi dan awal malam. Seperti tapir lain, ia juga akan bersembunyi di waktu siang.

Panjang: 6 kaki (1.8 m)

Berat: 330 paun (150 kg)

Status: Terancam


Taburan: Utara-Barat Amerika Selatan

Di mana tapir tinggal?




Tapir Tanah Rendah

Tapirus terrestris




Tapir Baird

Tapirus bairdii




Tapir Pergunungan

Tapirus pinchaque



Tapir Malaya

Tapirus indicus



Tapir Tanah Rendah

Tapirus terrestris



Tapir Tanah Rendah mempunyai bulu tengkuk yang pendek dan kasar. Ia juga mempunyai tompok putih di hujung telinga. Spesis ini gemar habitat akuatik dan sering dilihat berenang di dalam sungai. Bagi mengelakkan diri dari pemangsa seperti jaguar dan puma, tapir ini akan menyelam dengan pantas dan mendiamkan diri. Ia juga akan mencari makanan di waktu malam dan gemar pelbagai jenis rumput, dedaun, biji, buah dan vegetasi lain.

Panjang: 5 ½ - 6 ½ kaki (1.7 - 2 m)

Berat: 400 - 500 paun (181 - 226 kg)

Status: Lemah

Taburan: Amerika Selatan

Tapir Baird

Tapirus bairdii



Tapir Baird adalah yang terbesar berbanding tiga spesis lain yang terdapat di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tapir dewasa mempunyai warna tubuh yang menghampiri coklat gelap dan tompok putih di hujung telinga. Bahagian bawah leher dan pipi juga kelihatan berwarna kelabu cerah. Ia gemar memakan dedaun muda dan buah-buahan yang gugur di tanah dari pelbagai jenis pokok di kawasan hutan lembap dan paya. Ibu akan bersiul semasa berkomunikasi dengan anaknya. Tapir dewasa turut bersiul semasa menghalau individu lain dari menghampiri kawasan keliarannya.

Panjang: 6 ½ kaki (2 m)

Berat: 330 paun (150 kg)

Status: Terancam

Taburan: Utara-Barat Amerika Selatan